

การแปลผลระดับน้ำตาลในเลือด

หลังอาหาร 2-3 ชั่วโมง ด้วยตนเอง

การแปลผล : ปกติ = 120-140

พอใช้ = 141-160

ควบคุมไม่ได้ = 161 ขึ้นไป

ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร 2-3 ชั่วโมง

120-140

141-160

161 ขึ้นไป

ปกติ

พอใช้

ควบคุมไม่ได้

ลิงก์: <https://www.lark.com/blog/blood-sugar-chart/>



บันทึกการรับประทานอาหาร

FOOOD!!!

ว/ด/ป :

เวลาที่รับประทานอาหาร :

เวลาที่เจาะน้ำตาล :

ผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร (PPG) :

รายการอาหาร

- 1..... จำนวน.....
- 2..... จำนวน.....
- 3..... จำนวน.....
- 4..... จำนวน.....
- 5..... จำนวน.....

ว/ด/ป :

เวลาที่รับประทานอาหาร :

เวลาที่เจาะน้ำตาล :

ผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร (PPG) :

รายการอาหาร

- 1..... จำนวน.....
- 2..... จำนวน.....
- 3..... จำนวน.....
- 4..... จำนวน.....
- 5..... จำนวน.....

ว/ด/ป :

เวลาที่รับประทานอาหาร :

เวลาที่เจาะน้ำตาล :

ผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร (PPG) :

รายการอาหาร

- 1..... จำนวน.....
- 2..... จำนวน.....
- 3..... จำนวน.....
- 4..... จำนวน.....
- 5..... จำนวน.....

ว/ด/ป :

เวลาที่รับประทานอาหาร :

เวลาที่เจาะน้ำตาล :

ผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร (PPG) :

รายการอาหาร

- 1..... จำนวน.....
- 2..... จำนวน.....
- 3..... จำนวน.....
- 4..... จำนวน.....
- 5..... จำนวน.....

ว/ด/ป :

เวลาที่รับประทานอาหาร :

เวลาที่เจาะน้ำตาล :

ผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร (PPG) :

รายการอาหาร

- 1..... จำนวน.....
- 2..... จำนวน.....
- 3..... จำนวน.....
- 4..... จำนวน.....
- 5..... จำนวน.....

ว/ด/ป :

เวลาที่รับประทานอาหาร :

เวลาที่เจาะน้ำตาล :

ผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร (PPG) :

รายการอาหาร

- 1..... จำนวน.....
- 2..... จำนวน.....
- 3..... จำนวน.....
- 4..... จำนวน.....
- 5..... จำนวน.....